PUBVET, Publicações em Medicina Veterinária e Zootecnia.

Levantamento de ectoparasitos em ovinos no Município de Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte, Brasil

Caroline Gracielle Torres Ferreira¹, Jucélio da Silva Gameleira², Silvia Maria Mendes Ahid³

¹Médica Veterinária. e-mail: caroline-torres@hotmail.com

²Discente de Medicina Veterinária, Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). e-mail: jucelio_gameleira@hotmail.com

³Docente do Departamento de Ciências Animal, coordenadora do Laboratório de Parasitologia Animal da UFERSA. e-mail: ahid@ufersa.edu.br

Resumo

O Brasil tem um grande mercado potencial para produtos derivados da pele de pequenos ruminantes domésticos. Entretanto na exploração ovina as ectoparasitoses acarretam perdas econômicas, seja devido à mortalidade decorrente de altas infestações, ou indiretamente, por meio da irritação causada nos animais, levando-os a queda da produtividade e predisposição a infecções secundárias. Dentre as ectoparasitoses, a pediculose causada por piolhos mastigadores é a mais freqüente, que embora se tenha progressos tecnológicos no seu controle, vêm aumentando o risco de comprometimento da qualidade do couro, marcados pela intensa descamação da pele e possibilidade de parasitismo misto. Considerando a importância do conhecimento dos ectoparasitos dos ovinos, o presente trabalho objetiva identificar os

ectoparasitos que acometem os ovinos no município de Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte, Brasil. Foram examinados 1000 ovinos através de inspeção e palpação manual aleatórias em 10% desses animais, independente do sexo, recolhendo-se os ectoparasitos encontrados no corpo. Os espécimes coletados foram acondicionados em frascos individuais, por hospedeiro amostrado, contendo álcool a 70°GL como líquido conservador, para posterior identificação. No laboratório de Parasitologia Animal da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) foi realizada a identificação com auxílio de estereomicroscópio, utilizando-se chave dicotômica, segundo a bibliografia especializada. Dos 1000 ovinos examinados, 600 (60,0%) apresentaram infestação por *Damalinia ovis*, sendo 200 (33,3%) animais jovens e 400 (66,7%) animais adultos. Os resultados indicaram que os animais estudados são importantes hospedeiros de ectoparasitos, confirmando-se a presença disseminada de *D. ovis* corroborando com trabalhos em todo território nacional.

Palavras-chave: Phthiraptera, ovinos, nordeste

Survey of Ectoparasites in Sheep in the City of Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte, Brazil

Abstract

Brazil has a large potential market for products derived from the skin of small domestic ruminants. However in the ovine infestation cause economic losses, either due to high mortality due to infestation, or indirectly, caused by irritation in animals, causing them to fall in productivity and susceptibility to secondary infections. Among the infestation, pediculosis caused by lice is the most frequent, although it has been technological advances in their control, have increased the risk of compromising the quality of leather, marked by intense scaling of the skin and the possibility of mixed parasitism. Considering the importance of knowledge of the ectoparasites of sheep, this study aims to identify the parasites that affect sheep in the city of Jardim do Seridó, Rio

Grande do Norte, Brazil. 1000 sheep were examined by visual inspection and random manual palpation in 10% of these animals, regardless of sex, collecting the ectoparasites found in the body. The specimens were placed in individual bottles, per host sampled, containing alcohol 70 ° GL conservative as liquid for further identification. In the laboratory of Animal Parasitology of the Federal Rural University of Semi-Arid (UFERSA) was performed to identify with a stereomicroscope, using a dichotomous key, according to the literature. Of the 1000 sheep examined, 600 (60.0%) had *Damalinia ovis* infestation, 200 (33.3%) young animals and 400 (66.7%) adult animals. The results indicated that the animals are important hosts for ectoparasites, confirming the widespread presence of *D. ovis* corroborating jobs nationwide.

Keywords: phthiraptera, sheeps, northeast.

INTRODUÇÃO

O Brasil tem um grande mercado potencial para produtos derivados da pele de pequenos ruminantes domésticos, apresentando, também, condições favoráveis para a produção de calçados e vestuário em quantidades suficientes para suprir a demanda interna e gerar excedentes exportáveis (Brito et al., 2005). A ovinocultura brasileira vem crescendo em todas as regiões do País, tendo, inclusive, se destacado nas regiões Nordeste e Centro-Oeste.

Entretanto na exploração ovina as ectoparasitoses acarretam perdas econômicas, seja devido à mortalidade decorrente de altas infestações, ou indiretamente, por meio da irritação causada nos animais, levando-os a queda da produtividade e predisposição a infecções secundárias (Maciel et al., 2006). Dentre as ectoparasitoses, causadas por artrópodes, as mais importantes que acometem os caprinos e ovinos são a pediculose, sarna e miíases. A pediculose causada por piolhos mastigadores é a mais freqüente, que embora se tenha progressos tecnológicos no seu controle, vêm aumentando o risco de comprometimento da qualidade do couro, marcados pela intensa descamação da pele e possibilidade de parasitismo misto, pelos tipos hematófagos.

Considerando a importância do conhecimento dos ectoparasitos dos ovinos, o presente trabalho objetiva identificar os ectoparasitos que acometem os ovinos no município de Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte, Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido no município de Jardim do Seridó (06°35'02,4" S 36°46'26,4" W) que situa-se na mesorregião Central Potiguar e na microrregião Seridó Oriental e que apresenta um rebanho de ovinos com mais 7685 animais. Os animais examinados eram provenientes de propriedades de pequenos e médios criadores de criação extensiva.

Foram examinados 1000 ovinos através de inspeção e palpação manual aleatórias em 10% desses animais, independente do sexo, recolhendo-se os ectoparasitos encontrados no corpo. Os espécimes coletados foram acondicionados em frascos individuais, por hospedeiro amostrado, contendo álcool a 70°GL como líquido conservador. No laboratório de Parasitologia Animal da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) foi realizada a identificação com auxílio de estereomicroscópio, utilizando-se chave dicotômica, segundo a bibliografia especializada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos 1000 ovinos examinados, 600 (60,0%) apresentaram infestação por *Damalinia* ovis. Observou-se que ao exame clínico dos ovinos parasitados por *D. ovis* no Jardim do Seridó-RN, os animais apresentaram inquietação e prurido corroborando com os sinais clínicos observados em outros estudos (Bezerra et al., 2007). As ectoparasitoses são causas freqüentes de prejuízos econômicos a ovinocaprinocultura, pois ocasionam aos animais stress, irritação, diminuição do apetite, diminuição da produção e da produtividade, além da desvalorização na comercialização da pele.

Em relação à idade desses animais, dos 300 animais jovens examinados

200 (33,3%) estavam parasitados enquanto que dos 700 adultos, 400 (66,7%) apresentaram positivos para a presença de piolho.

A pele ou lã de ovinos, dependendo do peso do animal e da flutuação do mercado, pode representar até 25% do valor do animal. Para a região Nordeste que detém em torno de 51% do rebanho ovino nacional, isso representa uma grande fonte econômica, sobretudo para o sertão onde se concentra a maior parte dos rebanhos (Coelho et al., 2004). Em ovelhas infestadas artificialmente com piolho, de *D. ovis*, houve redução da lã em 0,3-0,8kg por ovelha, mas não afetou o peso do animal, o que representou uma perda de renda para o criador, de U\$ 0,72 a 1,92 para cada ovelha infestada, concordando com informações similares dos proprietários da área estudada, os quais afirmavam maiores perdas econômicas devido ao ectoparasitismo (Almeida, 2006).

Infestações por *D. ovis* freqüentemente ocorrem alterações no ganho de peso, qualidade de lã ou pele. Dessa forma, ovelhas tratadas produzem em média 34 % a mais lã que o grupos infestados sem tratamento (animal controle) e, a lã da ovelha tratada é de uma qualidade melhor. A média do ganho de peso vivo nos grupos tratados também é superior que em grupos sem tratamento. Quanto à hipersensibilidade, reações dérmicas de extratos (antígenos) de *Muscidae* e *Damalinia* são achados consistentes para *D. ovis*, este fato sugere que reações da pele devido à infestação com piolhos podem influenciar na suscetibilidade de ovinos em relação a outros ectoparasitos (Almeida, 2006).

Os resultados obtidos mostraram-se superiores aos obtidos no estado de São Paulo e Maranhão onde observou-se a prevalência de 13,8% e 3,4% para o parasitismo por *D. ovis*, entretanto nestes mesmos Estados constatou a ocorrência de piolhos e outros ectoparasitos de ovinos, resultados estes que não condizem com os encontrados no município de Jardim do Seridó.

Os animais com diagnóstico positivo de pediculose devem ser separados e tratados, pois a transmissão se dá pelo contato direto entre animais doentes e sadios do rebanho. Crawford et al. (2001) num estudo sobre transmissão de

FERREIRA, C.G.T., GAMELEIRA, J.S. e AHID, S.M.M. Levantamento de ectoparasitos em ovinos no Município de Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte, Brasil. **PUBVET**, Londrina, V. 5, N. 18, Ed. 165, Art. 1114, 2011.

piolhos em ovinos, observaram outras formas de transmissão da pediculose, além do contato direto, a exemplos de equipamentos, cercas, instalações contaminadas, lã e calçados de tosquiadores, funcionando como importantes meios de reinfestação, pois aumentam o tempo de sobrevivência do *Damalinia ovis*.

CONCLUSÕES

Notifica-se o parasitismo em ovinos por *Damalinia ovis* no município de Jardim do Seridó, corroborando com trabalhos em todo território nacional.

REFERENCIAS

ALMEIDA, V. F. **Ação dos fungos *Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae* (Metschnikoff 1879) Sorokin, 1883, *M. flavoridae* Gams & Roszypal, *Beauveria bassiana* (Balsamo) Vuillemin, 1912, sobre *Bovicola caprae* (Phtiraptera: Mallophaga, Ewing 1936) em caprinos naturalmente infestados em clima de semi-árido.** 2006. 50f. Dissertação (Pós-Graduação em Zootecnia –Sistemas Agrossilvopastoris no Semi-Árido) – Centro de Saúde e Tecnologia Rural, Universidade Federal de Campina Grande.

BEZERRA, A. C. D. S.; AHID, S. M. M.; VIEIRA, L. S. Prevalência de ectoparasitos em caprinos e ovinos do município de Mossoró, Rio Grande do Norte, **Acta Veterinária Brasília**, 1 (2): 68, 2007.

BRITO, D. R. B.; SANTOS, A. C. G.; GUERRA, R. M. S. N. C. Ectoparasitos em rebanhos de caprinos e ovinos na microrregião do Alto Mearim e Grajaú, Estado do Maranhão. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, 14 (2): 59-63, 2005.

COELHO, J. B. M; LINS, J. M.; ALVES, A. B.; SOARES, I. L. **Influência da cor da pelagem na qualidade da pele caprina/ ovina curtida ao cromo.** Disponível em: <<http://www.capritec.com.br/art030911.htm>>. Acesso em: 21 set 2010.

CRAWFORD, S.; JAMES, P. J.; MADDOCKS, S. Survival away from sheep and alternative methods of transmission of sheep lice (*Bovicola ovis*). **Veterinary Parasitology**, 94: 205-216, 2001.

MACIEL, F. C.; AHID, S. M. M.; MOREIRA, F. R. C. Manejo sanitário de caprinos e ovinos. In: LIMA, G. F. C et al. (Org) **Criação Familiar de Caprinos e Ovinos no Rio Grande do Norte: orientações para viabilização do negócio rural.** Natal: EMATER/EMPARN/EMBRAPA caprinos, p. 391-426, 2006.